

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
31. Mai 2001 (31.05.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/38508 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: C12N 15/00 (74) Anwalt: HUBER, Bernard; Patentanwälte Huber & Schüssler, Truderinger Strasse 246, D-81825 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03119
- (22) Internationales Anmeldedatum:
5. September 2000 (05.09.2000)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
199 56 272.5 23. November 1999 (23.11/1999) DE
- (71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US):* **MPB COLOGNE GMBH, MOLECULAR PLANT & PROTEIN BIOTECHNOLOGY [DE/DE];** Neurather Ring 1, D-51063 Köln (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Veröffentlicht:
— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder *(nur für US):* **DÜRING, Klaus** [DE/DE]; Vorgebirgsweg 33, D-50226 Frechen-Königsdorf (DE); **BÜLOW, Lorenz** [DE/DE]; Werder 2, D-38100 Braunschweig (DE).
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR CARRYING OUT THE CONTROLLED POST-HARVEST PRODUCTION OF PROTEINS IN HOST ORGANISMS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR GESTEUERTEN NACH-ERNT-PRODUKTION VON PROTEINEN IN WIRTSORGANISMEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for extracting a desired protein from a transgenic host organism, whereby the expression of the gene that codes for this protein is firstly carried out after the host organism has been harvested. The inventive method is characterized in that: (a) the transgenic host organism contains the gene that codes for the desired protein in such a way that the expression thereof is firstly carried out in the presence of a chemical inductor, and; (b) the gene is brought into contact with the inductor via the phase surrounding the host organism after the host organism has been harvested. The invention also relates to a host organism that is suited for carrying out said method.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Verfahren zur Gewinnung eines gewünschten Proteins aus einem transgenen Wirtsorganismus, wobei die Expression des für dieses Protein codierenden Gens erst nach der Ernte des Wirtsorganismus erfolgt und das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, daß (a) der transgene Wirtsorganismus das für das gewünschte Protein codierende Gen derart enthält, daß dessen Expression erst in Anwesenheit eines chemischen Induktors erfolgt und (b) das Inkontaktbringen mit dem Induktor nach der Ernte des Wirtsorganismus über die den Wirtsorganismus umgebende Phase erfolgt. Ferner betrifft die Erfindung einen zur Durchführung dieses Verfahrens geeigneten Wirtsorganismus.

WO 01/38508 A2

**Verfahren zur gesteuerten Nach-Ernte-Produktion
von Proteinen in Wirtsorganismen**

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung eines gewünschten Proteins aus einem transgenen Wirtsorganismus, wobei die Expression des für dieses Protein codierenden Gens erst nach der Ernte des Wirtsorganismus erfolgt und das Verfahren sich dadurch auszeichnet, daß die Expression des genannten Gens erst in Anwesenheit eines nach der Ernte des Wirtsorganismus diesem über die umgebende Phase, insbesondere Gas- oder Flüssigphase, zugeführten chemischen Induktors erfolgt.

In der Natur vorkommende Proteine sind oft nur in geringsten Mengen verfügbar, weisen aber hochinteressante Eigenschaften für Anwendungen als Wirk- und Werkstoffe auf. Da sie oft auch in rekombinanten Wirtssystemen, z.B. Bakterien, wie *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, etc., nicht effizient zu wirtschaftlichen Bedingungen und in ausreichenden Mengen gewonnen werden können, ist in diesen Fällen eine kommerzielle Anwendung nicht realisierbar. Um immer komplexere und in niedrigen Organismen schwer oder gar nicht produzierbare Proteine herstellen zu können, sind außerdem zunehmend Zellen höherer Organismen mit ihrer inhärenten komplexen Proteinbiosynthese-Maschinerie als Wirtszellen erforderlich. Hier bieten sich seit einigen Jahren transgene Tiere, Pflanzen, Pilze, Moose, Algen, etc. als neue rekombinante Wirte an. Angesichts der Verfügbarkeit immer größerer Zahlen gut charakterisierter Proteine aus der molekularen Forschung wächst dieser Technologie eine immer größere Bedeutung für die Anwendung zu.

Die Expression von Fremd-Proteinen kann allerdings negative Auswirkungen auf die physiologische Konstitution des Wirtsorganismus haben und z.B. dessen Wachstum beeinträchtigen oder gar verhindern. Zudem ist es denkbar, daß z.B. bei dem Anbau von transgenen Pflanzen, die medizinisch aktive Proteine exprimie-

ren, diese während des Wachstums der Pflanzen ein Gefährdungspotential für Organismen in der Umwelt darstellen. Daher hat die Nach-Ernte-Produktion von Fremd-Proteinen in transgenen Wirtsorganismen, insbesondere solchen, die landwirtschaftlich oder gartenbaulich kultiviert werden, eine große Bedeutung als technologischer Baustein auf dem Weg zu einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gewinnung von Proteinen. Andere (bio-)chemische Substanzen sind ebenfalls in transgenen Wirtsorganismen durch die Expression von Enzymen, die in deren Biosyntheseweg involviert sind, darstellbar. Auch hier besteht allerdings das Risiko negativer Auswirkungen auf den Wirtsorganismus, z.B. Wachstumshemmungen, oder hinsichtlich der biologischen Sicherheit. Da die Produktion (bio-)chemischer Substanzen in Wirtsorganismen ebenfalls auf der Expression von Proteinen, insbesondere Enzymen, beruht, gelten hierfür die gleichen technologischen Vorgaben.

Bisher wurden ausschließlich Nach-Ernte-Produktionssysteme beschrieben, die auf Verwundung von Pflanzenmaterial, z.B. bei Tabakpflanzen, durch Zerkleinerung ihrer Blätter beruhen. Dadurch soll das gewünschte Protein während des Anbaus der Tabakpflanzen auf dem Feld noch nicht, sondern erst nach der Ernte vor dem Aufarbeitungsprozeß produziert werden. Dies ist aber nur schwer zu realisieren, da ein verwundungsinduzierbarer Promotor in transgenen Pflanzen im landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Anbau, z.B. in Tabak, schon bei Fraßschäden, Wind- oder Hagelschäden, Trittschäden, Maschineneinsatz, etc. induziert wird. Ein weiterer Nachteil des bisherigen Verfahrens stellt außerdem die schwer zu erreichende gleichmäßige Verteilung des Induktionsstimulus über die gesamte zu induzierende Pflanzenmasse dar.

Somit liegt der vorliegenden Erfindung das technische Problem zugrunde, ein Nach-Ernte-Produktionssystem für ein gewünschtes Protein zur Verfügung zu stellen, das die Nachteile des im Stand der Technik beschriebenen Verfahren nicht aufweist, d.h. vor allem gewährleistet, daß die Genexpression zuverlässig erst nach der Ernte erfolgt, ein Zerkleinern des Pflanzengewebes nicht

erforderlich ist und der Induktor effizient und gleichmäßig mit den Zellen des betreffenden transgenen Wirtsorganismus ins Kontakt kommt.

Die Lösung dieses technischen Problems wird durch das in den Patentansprüchen angegebene erfindungsgemäße Verfahren erreicht.

In dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt die Induktion der Expression eines Fremd-Gens in einem Wirtsorganismus durch einen chemischen Induktor, der über die den Wirtsorganismus umgebende Phase verabreicht wird. Diese Phase kann eine Gas- oder eine Flüssigphase sein, wobei in ersterer Phase die chemische Induktion über eine Veränderung der Zusammensetzung der Gasphase, vorzugsweise eine anaerobe Induktion, eine Vernebelung von Lösungen (Suspensionen) fester oder flüssiger induzierender (Bio-)Chemikalien oder eine Verwendung flüchtiger Substanzen und deren gleichmäßige Verteilung im Reaktionsraum erfolgen kann. Ferner kann in der Flüssigphase die chemische Induktion über Lösungen fester oder flüssiger induzierender (Bio)Chemikalien erfolgen. Durch das erfindungsgemäße Verfahren können hochwertige Proteine oder andere (bio-)chemische Substanzen in großem Maßstab und daher für neue (bio)medizinische und technologische Anwendungsgebiete hergestellt werden.

Somit umfaßt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Gewinnung eines gewünschten Proteins aus einem transgenen Wirtsorganismus, wobei die Expression des für dieses Protein codierenden Gens erst nach der Ernte des Wirtsorganismus erfolgt und das Verfahren sich dadurch auszeichnet, daß

- (a) der transgene Wirtsorganismus das für das gewünschte Protein codierende Gen derart enthält, daß dessen Expression erst in Anwesenheit eines chemischen Induktors erfolgt; und
- (b) das Inkontaktbringen mit dem chemischen Induktor nach der Ernte des Wirtsorganismus über die den Wirtsorganismus umgebende Phase, insbesondere Gas- oder Flüssigphase, erfolgt.

Verfahren zur Konstruktion der zur Durchführung des erfin-

dungsgemäßen Verfahrens benötigten Nucleinsäurekonstrukte sind dem Fachmann bekannt und auch in gängigen Standardwerken beschrieben (vgl. z.B. Sambrook et al., 1989, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2. Aufl. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY). Das Nucleinsäurekonstrukt liegt vorzugsweise auf einem Vektor inseriert vor, wobei es sich bei dem Vektor vorzugsweise um ein Plasmid, ein Cosmid, ein Virus, einen Bacteriophagen oder einen anderen in der Gentechnik üblichen Vektor handelt. Diese Vektoren können weitere Funktionseinheiten besitzen, die eine Stabilisierung der Vektoren im Wirtszellorganismus bewirken, wie einen bakteriellen Replikationsursprung oder die 2-Mikron-DNA zur Stabilisation in *Saccharomyces cerevisiae*. Ferner können "left border"- und "right border"-Sequenzen agrobakterieller T-DNA enthalten sein, wodurch eine stabile Integration in das Erbgut von Pflanzen ermöglicht wird. Ferner kann eine Terminationssequenz vorhanden sein, die der korrekten Beendigung der Transkription und der Addition einer Poly-A-Sequenz an das Transkript dient. Derartige Elemente sind in der Literatur beschrieben (vgl. Gielen et al., EMBO J. 8 (1989), 23-29) und sind beliebig austauschbar.

Zur Vorbereitung der Einführung eines Fremd-Gens in höhere Pflanzen stehen eine große Anzahl von Klonierungsvektoren zur Verfügung, die ein Replikationssignal für *E.coli* und ein Marker-gen zur Selektion transformierter Bakterienzellen enthalten. Beispiele für derartige Vektoren sind pBR322, pUC-Serien, M13mp-Serien, pACYC184, etc. Das Fremdgen kann an einer passenden Restriktionsschnittstelle in den Vektor eingeführt werden. Das erhaltene Plasmid wird für die Transformation von *E.coli*-Zellen verwendet. Transformierte *E.coli*-Zellen werden in einem geeigneten Medium gezüchtet, anschließend geerntet und lysiert, wodurch das Plasmid erhalten wird. Als Analysemethode zur Charakterisierung der gewonnenen Plasmid-DNA werden im allgemeinen Restriktionsanalysen, Gelelektrophoresen und weitere biochemisch-molekularbiologische Methoden eingesetzt. Nach jeder Manipulation kann die Plasmid-DNA gespalten und gewonnene DNA-Fragmente können mit anderen DNA-Sequenzen verknüpft werden. Jede Plasmid-DNA-Sequenz kann in den gleichen oder anderen

Plasmiden kloniert werden.

Für die Einführung von DNA, z.B. in eine pflanzliche Wirtszelle, stehen eine Vielzahl von Techniken zur Verfügung. Diese Techniken umfassen die Transformation pflanzlicher Zellen mit T-DNA unter Verwendung von *Agrobacterium tumefaciens* oder *Agrobacterium rhizogenes* als Transformationsmittel, die Fusion von Protoplasten, die Injektion, die Elektroporation von DNA, die Einbringung von DNA mittels der biolistischen Methode sowie weitere Möglichkeiten.

Bei der Injektion und Elektroporation von DNA in Pflanzenzellen werden an sich keine speziellen Anforderungen an die verwendeten Plasmide gestellt. Es können einfache Plasmide, z.B. pUC-Derivate, verwendet werden. Sollen aber aus derartig transformierten Zellen ganze Pflanzen regeneriert werden, sollte ein selektierbarer Marker vorhanden sein. Je nach Einführungsmethode gewünschter Gene in die Pflanzenzelle können weitere DNA-Sequenzen erforderlich sein. Werden z.B. für die Transformation der Pflanzenzelle das Ti- oder Ri-Plasmid verwendet, so muß mindestens die rechte Begrenzung, häufig jedoch die rechte und linke Begrenzung der Ti- und Ri-Plasmid T-DNA als Flankenbereich mit den einzuführenden Genen verbunden werden.

Werden für die Transformation Agrobakterien verwendet, ist es günstig, die einzuführende DNA in spezielle Plasmide zu klonieren, insbesondere in einen intermediären oder in einen binären Vektor. Die intermediären Vektoren können aufgrund von Sequenzen, die homolog zu Sequenzen in der T-DNA sind, durch homologe Rekombination in das Ti- oder Ri-Plasmid der Agrobakterien integriert werden. Dieses enthält außerdem die für den Transfer der T-DNA notwendige vir-Region. Intermediäre Vektoren können nicht in Agrobakterien replizieren. Mittels eines Helferplasmids kann der intermediäre Vektor auf *Agrobacterium tumefaciens* übertragen werden. Binäre Vektoren können sowohl in *E.coli* als auch in Agrobakterien replizieren. Sie enthalten ein Selektionsmarker-Gen und einen Linker oder Polylinker, welche von der rechten und linken T-DNA Grenzregion eingerahmt werden.

Sie können direkt in die Agrobakterien transformiert werden. Das als Wirtszelle dienende Agrobakterium soll ein Plasmid, das eine vir-Region trägt, enthalten. Die vir-Region ist für den Transfer der T-DNA in die Pflanzenzelle notwendig. Zusätzliche T-DNA kann vorhanden sein. Das derartig transformierte Agrobakterium wird zur Transformation von Pflanzenzellen verwendet.

Für den Transfer der DNA in die Pflanzenzelle können Pflanzen-Explantate zweckmäßigerweise mit *Agrobacterium tumefaciens* oder *Agrobacterium rhizogenes* kokultiviert werden. Aus dem infizierten Pflanzenmaterial, z.B. Blattstücke, Stengelsegmente, Wurzeln, Protoplasten oder Suspensions-kultivierte Pflanzenzellen können dann in einem geeigneten Medium, welches Antibiotika oder Biozide zur Selektion transformierter Zellen enthalten kann, wieder ganze Pflanzen regeneriert werden. Die so erhaltenen Pflanzen können dann auf Anwesenheit der eingeführten DNA untersucht werden. Andere Möglichkeiten der Einführung fremder DNA unter Verwendung des biolistischen Verfahrens oder durch Protoplasten-Fusion sind bekannt.

Alternative Systeme zur Transformation von monokotylen Pflanzen sind die Transformation mittels des biolistischen Ansatzes, die elektrisch oder chemisch induzierte DNA-Aufnahme in Protoplasten, die Elektroporation von partiell permeabilisierten Zellen, die Makroinjektion von DNA in Blütenstände, die Mikroinjektion von DNA in Mikrosporen und Pro-Embryonen, die DNA-Aufnahme durch keimende Pollen und die DNA-Aufnahme in Embryonen durch Quellung (zur Übersicht: Potrykus, *Physiol. Plant* (1990), 269 - 273). Während die Transformation dikotyler Pflanzen über Ti-Plasmid-Vektorsysteme mit Hilfe von *Agrobacterium tumefaciens* etabliert ist, weisen neuere Arbeiten darauf hin, daß auch monokotyle Pflanzen der Transformation mittels *Agrobacterium* basierender Vektoren zugänglich sind.

Bei den in dem erfindungsgemäßen Verfahren nützlichen transgenen Wirtsorganismen kann es sich prinzipiell um Pflanzen jeder beliebigen Pflanzenspezies handeln, d.h. sowohl monokotyle als auch dikotyle Pflanzen. Bevorzugt handelt es sich um Nutz-

pflanzen, insbesondere um Pflanzen, wie Weizen, Gerste, Reis, Mais, Zuckerrübe, Zuckerrohr, Kartoffel, Brassicaceen, Leguminosen oder Tabak. Die für die Expression des gewünschten Proteins bzw. die Behandlung mit den chemischen Induktoren gewünschten Pflanzenteile betreffen prinzipiell jedes beliebige Pflanzenteil, jedenfalls Vermehrungsmaterial und Ernteprodukte dieser Pflanzen, z.B. Früchte, Samen, Knollen, Wurzelstöcke, Sämlinge, Stecklinge, etc.

Ferner kann in dem erfindungsgemäßen Verfahren jegliches Protein, insbesondere ein diagnostisches, ein therapeutisches und/oder ein Werkstoff-Protein hergestellt werden. Das Protein kann aus jeglichem Individuum, insbesondere dem Menschen oder einem Tier, stammen. Auch kann das Protein in Wildtyp- oder veränderter Form vorliegen. Ferner kann es ein Fusionsprotein oder ein Proteinfragment sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in Schritt (b) das Inkontaktbringen mit dem chemischen Induktor über die den Wirtsorganismus umgebende Gasphase. Vorzugsweise erfolgt dies über eine Veränderung der den Wirtsorganismus umgebenden Gasphase, d.h. die Gasphase dient als Träger des Induktionsstimulus, über eine Vernebelung einer Lösung des Induktors oder über ein Überströmen mit einem flüchtigen Induktor. Vorzugsweise führt die Veränderung der Gasphase im Wirtsorganismus zur Induktion, z.B. des betroffenen Promotors. Alleine aus physikalischen Gründen durch die Ausnutzung des Diffussionseffektes wird bereits nach einer bestimmten Zeit eine homogene Verteilung des Induktionsstimulus erreicht. Die Zeitspanne bis zur Einstellung dieser homogenen Verteilung wird durch den Einsatz einer aktiven Umwälzung der Gasphase im Reaktionsraum wesentlich verkürzt. Somit wird insbesondere bei dicht aneinanderliegenden Zellmassen, wie bei Pflanzenblättern, Algen- oder Moosgewebe, eine gleichmäßige und schnelle Durchdringung erreicht. Insbesondere bei kompakten Geweben, z.B. Kartoffelknollen, ist die erfindungsgemäße schnelle Durchdringung des Gewebes von großem Vorteil.

Geeignete gasförmige Induktoren sowie Bedingungen zum möglichst effizienten Austausch der Gasphase sind dem Fachmann bekannt. Es wird auf das Anaerocult-System (Merck, Darmstadt, Deutschland) verwiesen, das ein anaerobes Milieu, in dem Sauerstoff gebunden und CO₂ freigesetzt werden, erzeugt. In diesem System wird der GapC4 Promoter aus Mais anaerob durch die CO₂-Atmosphäre induziert (Bülow, L. et al., Molecular Plant-Microbe Interactions (1999), 182-188). Ebenso wird der gleiche Effekt durch Einleitung von technischem Stickstoff erreicht. Ein weiteres Beispiel ist die Induktion von "Pathogenesis related protein"-Promotoren, wie L-Phenylalanin Ammonium Lyase-, Chalcon Synthase- oder "Hydroxyproline rich glycoprotein"-Promotoren durch Ethylen (Ecker, J.R. und Davis, R.W., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84 (1987), 5202-5206).

Für eine Vernebelung geeignete lösliche Induktoren sowie Bedingungen zur möglichst effizienten Vernebelung sind dem Fachmann ebenfalls bekannt. Es wird auf ein chimäres Transkriptions-Induktionssystem verwiesen, das durch den löslichen Induktor Dexamethasone induziert wird (Plant J. 11 (1997) 605-612; Kunkel et al., Nature Biotechnol. 17(1999), 916-918). Der Incw1-Promoter von Mais wird durch die Zugabe von Sucrose oder D-Glucose aktiviert (Chen, W.H. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96 (1999), 10512-10517). Viele "Pathogenesis related protein"-Promotoren werden durch Salicylsäure aktiviert (Gaffney et al., Science 261 (1993), 754-756). Ein flüchtiger Induktor ist Methylsalicylat, das in der aufnehmenden Pflanze zu Salicylat umgewandelt wird, welches, wie vorstehend beschrieben, induzierend wirkt (Shulaev, V. et al., Nature 385 (1997), 718-721). Die Vernebelung von Lösungen, z.B. von Promotor-induzierender (Bio-) Chemikalien, bietet den Vorteil der technisch einfachen und gleichmäßigen Verteilung der induzierenden Substanz um das zu induzierende Gewebe herum und in das Gewebe hinein. Vorzugsweise wird durch aktive Umwälzung der Gasphase eine schnelle Einstellung der gleichmäßigen Verteilung gefördert. Zudem wird dadurch ein einfacher und effizienter Ausgleich von entstehenden Konzentrationsunterschieden erreicht, so daß kontrollierte Prozeßbedingungen gewährleistet werden können. In einer

besonders bevorzugten Ausführungsform wird für die Vernebelung die Agrochemikalie RH5992 (Tebufenozide, Rohm & Haas, Croyden, UK) verwendet, wobei RH5992 über ein chimäres Transkriptions-aktivatorprotein als Induktor für den zu induzierenden Promotor fungiert (Gatz und Lenk, Trends in Plant Science 3 (1998), 352-358). Der Promotor wird spezifisch durch RH5992 angeschaltet und ist ohne Vorhandensein dieser Verbindung inaktiv. Der Induktor-Nebel wird dabei z.B. durch eine kontinuierliche Luftverteilung gleichmäßig an das zu induzierende Gewebe herangespült. Durch Diffusion von der Gewebeoberfläche in die Zellen hinein wird die wirksame Induktion des Promotors erreicht.

Für ein Überströmen geeignete flüchtige Induktoren und durch diese induzierbare Promotoren sind dem Fachmann ebenfalls bekannt. Insbesondere ist Methylsalicylat zu nennen, das in der aufnehmenden Pflanze zu Salicylat umgewandelt wird, welches, wie vorstehend beschrieben, induzierend wirkt (Shulaev, V. et al., supra). Ein weiteres Beispiel für einen flüchtigen Induktor ist Ethanol, welches den alca Promotor aus *Aspergillus nidulans* in transgenem Tabak induziert (Caddick, M.X. et al., Nature Biotechnology 16 (1998), 177-180). Für ein aktives Überströmen wird so vorgegangen, daß der flüssige oder feste (flüchtige) Induktor mit einem geeigneten gasförmigen Trägermedium zur Überführung in die flüchtige, gasförmige Phase überströmt wird und vorzugsweise wird eine aktive Umwälzung der Gasphase durchgeführt, um die gleichmäßige Verteilung des Induktors zu erreichen.

In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in Schritt (b) das Inkontaktbringen mit dem chemischen Induktor über die den Wirtsorganismus umgebende Flüssigphase. Vorzugsweise erfolgt dies über Lösungen fester oder flüssiger induzierender (Bio)Chemikalien. Es wird auf vorstehende Ausführungen hinsichtlich der Vernebelung von löslichen Induktoren verwiesen. Günstig kann es sein, den chemischen Induktor über Virus-Suspensionen, z.B. den Tabakmosaikvirus (TMV) bei Tabak, an den Wirtsorganismus heranzuführen, d.h. diesen hiermit zu infizieren.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das für das gewünschte Protein codierende Gen mit einem induzierbaren Promotor verknüpft. Geeignete Promotoren und die hierfür in Frage kommenden Inhibitoren (gasförmige, flüssige oder feste, flüchtige Verbindungen) sind dem Fachmann bekannt. Hierzu zählen z.B. die vorstehend beschriebenen Systeme GapC4 Promotor / CO₂ (Bülow et al., supra), der Adh1 Promotor aus Mais / Anaerobiose (Ellis et al., EMBO J. 6 (1987), 11-16), die L-Phenylalanin Ammonium Lyase-, Chalcon Synthase- oder "hydroxyproline rich glycoprotein"-Promotoren / Ethylen (Ecker, J.R. und Davis, supra), das chimäre Transkriptionsinduktionssystem / Dexamethasone (Plant J., supra), der Incw1-Promoter aus Mais / Sucrose oder D-Glucose (Chen, W.H. et al., supra), viele "Pathogenesis related protein"-Promotoren / Salicylsäure oder Methylsalicylat (Gaffney et al., supra; Shulaev et al., supra), der alcA Promotor aus *Aspergillus nidulans* in transgenem Tabak / Ethanol (Caddick, M.X. et al, supra).

Vorzugsweise handelt es sich bei dem Promotor um einen unter aeroben Bedingungen inaktiven Promotor, wie den GapC4-Promotor oder den Adh1-Promotor und die Induktion erfolgt über eine Veränderung der Gasphase derart, daß es sich um einen Sauerstoffentzug handelt. Besonders bevorzugt ist hierbei der anaerob induzierbare GapC4 Promotor (DE 195 47 272), z.B. in Verbindung mit abgeerntetem transgenem Pflanzengewebe, z.B. transgenen Kartoffelknollen. Die meisten pflanzlichen Promotoren werden unter anaeroben Bedingungen abgeschaltet, während der GapC4 Promotor unter aeroben Bedingungen ausgeschaltet ist und durch einfachen Sauerstoffentzug angeschaltet wird (Bülow et al., supra). Dies wird z.B. durch die Einleitung von Stickstoff oder Kohlendioxid in den Reaktions- oder Lagerraum erreicht. Innerhalb weniger Stunden wird somit auch in einer intakten Kartoffelknolle ein vollständig anaerobes Milieu erreicht, wodurch die Promotorinduktion und Fremdproteinexpression erfolgt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungs-

gemäßen Verfahrens erfolgt die Induktion der Expression des für das gewünschte Protein codierenden Gens durch Aufhebung der funktionellen Hemmung der Transkription und/oder Translation. Ein Beispiel für eine transkriptionale Hemmung ist das HRT-Protein (Repressor) aus Gerste, welches an das "Gibberellin-phytohormone response element" des α -Amylase-Promotors aus Gerste bindet (Raventos, D. et al., J. Biol. Chem. 273 (1998), 23313-23320). Wird dieser Repressor unter der Kontrolle des CaMV 35S Promotors unter aeroben Bedingungen in einer transgenen Pflanze exprimiert, so bindet er an die Targetsequenz, welche zwischen dem für das gewünschte Protein codierenden Gen und seinem Promotor eingefügt ist. Bei Erzeugung anaerober Bedingungen wird der 35S-Promotor abgeschaltet und die Repressor-synthese unterbunden, folglich das vorstehende Gen durch den Abbau des vorhandenen Repressors aktiviert.

Ein Beispiel für die translationale Hemmung ist die Repression der Translation des Ferritin-Transkripts in Weizenkeimextrakten durch die Expression eines 90 kDa Repressors aus Rattenleber, welcher an die 5'-untranslatierte Region der Ferritin-mRNA bindet (Brown, P.H., J. Biol. Chem. 264 (1989), 13383-13386). Der Repressor der Ferritin-mRNA wird vor die für das gewünschte Protein codierende cDNA-Sequenz inseriert und der Repressor wird in der transgenen Pflanze exprimiert.

Auch kann die Aktivität des Repressors durch einen Induktor oder Inhibitor direkt kontrolliert werden. Beispielsweise erfolgt regulierte transkriptionale Aktivierung der PS-IAA4/5- und PS-IAA6-Promotoren in *Pisum sativum* durch Zugabe von Indolelessigsäure oder Cycloheximid, so daß das Transkript erst bei Vorhandensein dieser Aktivatoren erzeugt wird (Koshiba, T. Et al., J. Mol. Biol. 253 (1995) 396-413). Die translationale Repression des tet-Operators in transgenen Arabidopsis-Pflanzen wird z.B. durch Zugabe von Tetrazyklin direkt aufgehoben (Ulmasov, B. et al., Plant Mol. Biol. 35 (1997), 417-424).

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das erfindungsgemäße Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß das für das

gewünschte Protein codierende Gen derart mit einem Promotor funktionell verknüpft ist, daß zwischen dem Promotor und dem Gen eine Nucleinsäure inseriert ist, die dadurch gekennzeichnet ist, daß (a) sie die Transkription und/oder Translation des Gens verhindert; und (b) mittels Induktion exzisiert werden kann, was zur Expression des Gens führt. Somit wird im nicht-induzierten Zustand die Transkription oder Translation des gewünschten Gens unterbunden und damit auch das von diesem Gen codierte Fremd-Protein nicht gebildet. Bei einer noch mehr bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist die inserierte Nukleinsäure durch eine reprimierte und induzierbare Rekombinase exzisierbar. Das für die Rekombinase codierende Gen kann dabei getrennt in die Wirtspflanze eingebracht werden oder selbst auf der inserierten Nucleinsäure lokalisiert sein. Erst nach Aktivierung der Rekombinase durch einen (bio-)chemischen, physikalischen oder genetischen Induktor erfolgt eine orts-spezifische Rekombination und damit eine Exzision dieser Nukleinsäuresequenz, wodurch das gewünschte Gen direkt strom-abwärts zum Promotor lokalisiert wird, was die Transkription und Translation und somit die Fremd-Protein-Biosynthese initiiert. Hinsichtlich der die Rekombinase aktivierenden Induktoren wird auf vorstehende Ausführungen bezüglich Promotor Induktions-systeme verwiesen. Besonders wird erwähnt, daß das Rekombinase-Gen auf einem Virus, z.B. TMV, liegen kann und erst nach Infektion des Wirtsorganismus aktiviert wird.

Am meisten bevorzugt für das erfindungsgemäße Verfahren ist das Rekombinase-LBD-System (WO 95/00555). Dieses wird wie folgt zwischen dem Promotor und dem zu exprimierenden Fremd-Gen inseriert:

5'-Promotor -- R -- Rekombinase-LBD -- R -- zu exprimierendes Fremd-Gen -- Terminator -3'

(R=Rekombinationsstelle für Rekombinase-LBD)

Die Rekombinase ist durch die Fusion mit der LBD-Domäne inaktiviert. Nach der Ernte des Pflanzenmaterials wird dieses mit dem die Fremd-Protein-Produktion aktivierenden, an die LBD--

Domäne bindenden Induktor, z.B. Östradiol, inkubiert. Dadurch wird die Rekombinase aktiviert, folglich an den beiden Rekombinationsstellen das die Rekombinase codierende cDNA-Fragment herausgeschnitten und somit das zu exprimierende Gen direkt stromabwärts an den Promotor lokalisiert. Dadurch wird nunmehr die Transkription und Translation des zu exprimierenden Gens ermöglicht und das Fremd-Protein unter kontrollierten Bedingungen produziert.

Eine weitere alternative bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß die Expression des für das gewünschte Protein codierenden Gens durch die Aufhebung der Wirkung eines transkriptionalen, posttranskriptionalen, translationalen oder posttranslationalen Repressors erfolgt, wobei die Ablösung des Repressors von der gebundenen Nukleinsäure- bzw. Proteinsequenz durch einen externen Stimulus induziert wird. Es wird auf vorstehende Ausführungen bezüglich der Aufhebung der funktionellen Hemmung der Transkription und/oder Translation verwiesen.

Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren, bei dem verschiedene der vorstehend beschriebenen Induktionsmechanismen, z.B. als Zweikomponenten-System, kombiniert werden. Dadurch kann eine noch restriktivere Regulierung der Fremd-Genexpression, z.B. in transgenen Pflanzen, und damit ein noch weiter gesteigertes Maß der biologischen Sicherheit erreicht werden, gleichzeitig können aber auch potentielle negative Effekte auf die Physiologie der Pflanze unterbunden werden. Beispielsweise kann dazu ein durch eine gasförmige Substanz induzierbarer Promotor, z.B. der anaerob induzierbare GapC4-Promotor aus Mais, oder ein auf einem Repressor basierendes System mit einem anderen System, z.B. einem auf Rekombination basierenden System, kombiniert werden, sodaß die Transkription des betreffenden Fremd-Gens ausgehend von dem induzierbaren Promotor erst nach erfolgter Zusammenführung von Promotor und Gen durch gesteuerte Rekombination ermöglicht wird. Als Rekombinationssystem kann z.B. das vorstehend beschriebene Rekombinase-LBD-System (WO 95/00555) verwendet werden, das aus

einer 5' Rekombinationsstelle für die Rekombinase, der für das Rekombinase-LBD-Protein codierenden cDNA und einer 3' Rekombinationsstelle für die Rekombinase besteht. Bei diesem Zweikomponenten-System ist der Promotor unter aeroben Bedingungen inaktiv. Die Rekombinase ist durch die Fusion mit der LBD-Domäne ebenfalls inaktiviert. Somit herrscht doppelte Repression vor. Unter landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bedingungen erfolgt somit keine Expression des Fremd-Gens, selbst wenn eines der beiden Repressionssysteme durch einen Umweltstimulus nicht vollständig blockiert sein sollte. Dieser negative Effekt würde dann durch das zweite (Repressions)system aufgefangen. Nach der Ernte des Pflanzenmaterials wird zur Fremdprotein-Produktion des an die LBD-Domäne bindende Induktor zugegeben und außerdem werden anaerobe Bedingungen in der Reaktionskammer hergestellt. Dadurch wird einerseits die Rekombinase aktiviert, folglich an den beiden Rekombinationsstellen das die Rekombinase codierende cDNA-Fragment herausgeschnitten und somit das zu exprimierende Gen direkt an den anaeroben Promotor lokalisiert. Durch Erzeugung anaerober Bedingungen wird nunmehr die Transkription und Translation des zu exprimierenden Gens ermöglicht und das Fremd-Protein unter kontrollierten Bedingungen produziert.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Wirtsorganismen, die das für das gewünschte Protein codierende Gen derart enthalten, daß dessen Expression erst in Anwesenheit eines chemischen Induktors erfolgt. Insbesondere sind es Wirtsorganismen mit einer vorstehend beschriebenen Transgenität. Es wird auf die vorstehenden Ausführungen entsprechend verwiesen.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Beispiel 1: Anaerobe Nach-Ernte-Produktion von scFv in transgenen Kartoffeln

Der anaerob induzierbare GapC4 Promotor (DE 195 47 272) wurde mittels einer PCR-Reaktion derart modifiziert, daß er am 5'-Ende eine HincII-Restriktionsschnittstelle und eine NcoI-Restriktionsschnittstelle erhielt. Für die PCR-Reaktion wurde folgendes

Primerpaar verwendet:

HincII-pGapC4 Primer: CATGTCAACACATAAGGAAGAAGAGGTAGAAAG

pGapC4-NcoI Primer: CATGCCATGGATCGATGACGGGGTTGGCGAGTGTG

Die von Artsaenko et al., Molecular Breeding 4 (1998), 313-319 beschriebene cDNA, die für einen im endoplasmatischen Retikulum lokalisierten scFv-Antikörper codiert, wurde mittels einer Linker-Ligation (am 5'-Ende mit CATGCCATGGCATG, [5'-phosphoryliertes Oligonukleotid]; am 3'-Ende mit GCTCTAGAGC [5'-phosphoryliertes Oligonukleotid] derart modifiziert, daß sie am 5'-Ende eine NcoI-Restriktionsschnittstelle und am 3'-Ende eine XbaI-Restriktionsschnittstelle aufwies. Aus dem Plasmid pRT100 (Töpfer et al., Nucleic Acids Research 15 (1987), 5890) wurde der CaMV 35S Promotor mittels Restriktionsverdau mit HincII und XbaI entfernt. Stattdessen wurden die beiden vorstehend beschriebenen Nucleinsäurefragmente, die für den GapC4 Promotor und den scFv-Antikörper codieren, inseriert. Nach partieller Spaltung mit HindIII wurde die Expressionskassette isoliert und in den binären Vektor pSR 8-30 inseriert (Düring et al., Plant Journal 3 (1993), 587-598; Porsch et al., Plant Molecular Biology 37 (1998), 581-585). Es wurde der Expressionsvektor pSR 8-30/Gap-scFv(ox) erhalten.

Dieser wurde zur Transformation von E.coli SM10 (Koncz und Schell, Molecular and General Genetics 204 (1986), 383-296) verwendet. Transformanten wurden mit Agrobacterium GV 3101 (Koncz und Schell, supra) gemischt und über Nacht bei 28°C inkubiert (Koncz et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA 84 (1987), 131-135). Es wurde auf Carbenicillin selektioniert, wobei das hierfür notwendige bla-Gen in den vorstehenden Expressionsvektoren vorliegt. Selektionsklone von Agrobacterium tumefaciens wurden auf abgeschnittenen und mehrfach an der Mittelrippe eingeritzten Blättern der Kartoffelpflanze cv. Désirée aufgebracht und die Blätter wurden 2 Tage bei 20°C im Dunkeln inkubiert. Danach wurden die Agrobakterien abgewaschen und den Kartoffelblättern Pflanzenwuchsstoffe zugesetzt, so daß bevorzugt Sprosse regenerierten. Ferner wurden durch die Zugabe von

Kanamycin (100 mg/ml) in das Pflanzenmedium nicht-transformierte Zellen in den Kartoffelblättern abgetötet. Heranwachsende Sprosse wurden abgeschnitten und in dem Medium ohne Pflanzenwachstumsstoffe, aber mit Kanamycin, bewurzelt. Die weitere Kultivierung der Kartoffelpflanzen erfolgte in üblicher Weise.

Zum Nachweis der Expression des scFv-Antikörpers wurde abgeschnittenes Blattmaterial oder intaktes oder geschnittenes Knollenmaterial mittels des "Anaerocult"-Systems (Fa. Merck, Darmstadt, Deutschland) wie bei Bülow et al. (1999), Supra beschrieben, induziert. Nach 40 Stunden wurde das Blattmaterial entnommen und gemörsert. Der Nachweis des exprimierten scFv-Antikörpers wurde über den enthaltenen c-myc Tag mittels des monoklonalen Antikörpers 9E10-IgG (Cambridge Research Chemicals, Northwich, Cheshire, UK) oder Protein L (Clontech, Palo Alto, CA., USA) im Western Blot bzw. ELISA erbracht. Hierzu wurde das Gesamtprotein des Kartoffelmateri als isoliert und in die entsprechenden Nachweisverfahren eingesetzt.

Als expressionspositiv ermittelte transgene Kartoffelpflanzen wurden im Gewächshaus (im Topf oder im Erdbeet) oder im Freiland unter üblichen gartenbaulichen bzw. landwirtschaftlichen Bedingungen angebaut. Die Knollen wurden nach üblicher Handhabung geerntet und gelagert. Für die Nach-Ernte-Produktion des scFv-Antikörpers wurden die Knollen in einen Reaktionsbehälter aus Stahl (oder Kunststoff) verbracht, der unten ein Gaszufuhrventil und oben ein Gasabführventil aufwies. Die Raumluft im Behälter wurde schnell von technischem Stickstoff (oder Kohlendioxid) verdrängt. Unter langsamem Gasstrom (1 m³ Gaszufuhr pro Stunde pro m² Grundfläche) wurde eine konstante Zusammensetzung der Gasphase im Reaktionsbehälter eingestellt. Nach 40 Stunden wurden die Knollen aus dem Reaktionsbehälter entnommen, homogenisiert, der Festanteil abzentrifugiert und der wäßrige Überstand der chromatographischen Aufreinigung des scFv-Antikörpers zugeführt. Durch Vergleich von Proben vor und nach Sauerstoffentzug konnte gezeigt werden, daß vor der Verdrängung des Sauerstoffs kein scFv-Antikörper, danach jedoch signifikante Mengen davon produziert wurden.

**Beispiel 2: Rekombinations-vermittelte Nach-Ernte-Produktion
in transgenen Kartoffeln**

Die in Artsaenko et al. (1998) beschriebene cDNA, die für einen im endoplasmatischen Retikulum lokalisierten scFv-Antikörper codiert, wurde mittels einer Linker-Ligation wie in Beispiel 1 beschrieben, derart modifiziert, daß sie am 5' Ende eine NcoI-Restriktionsschnittstelle und am 3' Ende eine XbaI-Restriktionsschnittstelle aufwies. Diese Nucleinsäuresequenz wurde in das Plasmid pRT 100 in die Polylinkersequenz inseriert. Es wurde das Plasmid pRT100/scFv(ox) erhalten. In die NcoI-Restriktionsstelle von pRT100/scFv(ox) wurde eine synthetische Nucleinsäure inseriert, die zwei FRT-Rekombinationsstellen (Buchholz et al., Nucleic Acids Res. 24 (1996), 3118-3119) enthält. Es wurde das Plasmid pRT 100/FRT-scFv(ox) erhalten. Die codierende cDNA für das FLP-Rekombinase-LBD-Fusionsprotein (WO 95/00555) wurde als PCR-adaptiertes NcoI-XbaI-Fragment in die NcoI-Schnittstelle von pRT 100 in der Sense-Orientierung hinter den CaMV 35S Promotor (Odell et al., Nature 313 (1985), 810-812) inseriert (Plasmid pRT 100/FLP). Folgendes Primer-Paar wurde hierfür verwendet:

NcoI-PLP-LBD Primer: CATGCCATGCCACAATTTGATATATTATGTAAAAC
FLP-LBD-XbaI Primer: GCTCTAGATCAGACTGTGGCAGGGAAACCCTC

Zwischen die beiden FRT-Rekombinationsstellen in pRT 100/FRT-scFv(ox) wurde die Expressionskassette aus pRT 100/FLP als partiell verdautes PstI-Fragment inseriert. Dadurch wurde das Plasmid pRT 100/rec-scFv(ox) erhalten.

Nach Spaltung mit HindIII wurde die Expressionskassette aus pRT 100/rec-scFv(ox) isoliert und in den binären Vektor pSR 8-30 inseriert (Dürring et al., Plant Journal 3 (1993), 587-598; Porsch et al., Plant Molecular Biology 37 (1998), 581-585). Es wurde der Expressionsvektor pSR 8-30/rec-scFv(ox) erhalten. Die Erzeugung transgener Kartoffelpflanzen erfolgte wie im vorstehenden Beispiel 1 beschrieben.

18

Zum Nachweis der Expression des scFv-Antikörpers wurden in vitro kultivierte Kartoffelpflanzen auf Medium mit 10^{-6} M Östradiol (Sigma Chemicals, St. Louis, MO, USA) umgesetzt und für 2 Tage kultiviert. Danach wurde das Pflanzenmaterial geerntet und gemörsert. Der Nachweis exprimierter scFv-Antikörper wurde wiederum über den enthaltenen c-myc Tag (vgl. supra) oder Protein L im Western Blot bzw. ELISA durchgeführt. Hierzu wurde das Gesamtprotein des Kartoffelmateri als isoliert und in die entsprechenden Nachweisverfahren eingesetzt.

Kartoffelpflanzen von als expressionspositiv ermittelten Linien wurden aus der Klonalen in vitro-Kultur genommen und im Gewächshaus ausgepflanzt. Diese Einzelpflanzen waren noch nicht mit Östradiol behandelt, so daß noch keine Rekombination stattgefunden hatte. Gleichmaßen erfolgte der Anbau im Feld nach üblichen landwirtschaftlichen Bedingungen. Die Knollen wurden nach üblicher Handhabung geerntet und gelagert. Für die Nach-Ernte-Produktion des scFv-Antikörpers wurden die Knollen mit einer vernebelten Lösung von 10^{-6} M Östradiol in einem Reaktionsbehälter inkubiert. Die technische Ausführung erfolgte, wie im vorstehenden Beispiel 1 beschrieben. Nach 40 Stunden wurden die Knollen aus dem Reaktionsbehälter entnommen, homogenisiert, der Festanteil wurde abzentrifugiert und der wäßrige Überstand der chromatographischen Aufreinigung des scFv-Antikörpers zugeführt. Durch Vergleich von Proben vor und nach Kontakt mit Östradiol konnte gezeigt werden, daß vor dem Inkontaktbringen mit Östradiol kein scFv-Antikörper, danach jedoch signifikante Mengen davon produziert wurden.

Patentanspruch

1. Verfahren zur Gewinnung eines gewünschten Proteins aus einem transgenen Wirtsorganismus, wobei die Expression des für dieses Protein codierenden Gens erst nach der Ernte des Wirtsorganismus erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß
 - (a) der transgene Wirtsorganismus das für das gewünschte Protein codierende Gen derart enthält, daß dessen Expression erst in Anwesenheit eines chemischen Induktors erfolgt; und
 - (b) das Inkontaktbringen mit dem Induktor nach der Ernte des Wirtsorganismus über die den Wirtsorganismus umgebende Phase erfolgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Phase eine Gasphase ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Phase eine Flüssigphase ist.
4. Verfahren nach Anspruch 2, wobei Schritt (b) eine Veränderung der den Wirtsorganismus umgebenden Gasphase, eine Vernebelung einer Lösung (Suspension) eines Induktors oder ein Überströmen mit einem flüchtigen Induktor umfaßt.
5. Verfahren nach Anspruch 3, wobei Schritt (b) eine Infektion mit einer Virus-Suspension umfaßt.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 5, wobei das für das gewünschte Protein codierende Gen mit einem induzierbaren Promotor funktionell verknüpft ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 4 und 6, wobei die Veränderung der Gasphase ein Sauerstoffentzug ist und der Promotor ein unter aeroben Bedingungen inaktiver Promotor ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Promotor der GapC4 Promotor ist.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 4 und wobei in Schritt (b) das Inkontaktbringen mit dem chemischen Induktor über eine Vernebelung des Induktors RH5992 erfolgt.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Induktion der Expression des für das gewünschte Protein codierenden Gens durch Aufhebung der funktionellen Hemmung der Transkription und/oder Translation erfolgt.
11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das für das gewünschte Protein codierende Gen so mit einem Promotor funktionell verknüpft ist, daß zwischen dem Promotor und dem Gen eine Nucleinsäure inseriert ist, die dadurch gekennzeichnet ist, daß
 - (a) sie die Transkription und/oder Translation des Gens verhindert; und
 - (b) sie nach Induktion exzisiert werden kann, was zur Expression des Gens führt.
12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Nucleinsäure eine durch eine induzierbare Rekombinase exzisierbare Nucleinsäure ist.
13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die exzisierbare Nucleinsäure und die Rekombinase Bestandteile des Rekombinase-LBD-Systems sind.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3, wobei die Expression des für das gewünschte Protein codierenden Gens durch die Aufhebung der Wirkung eines transkriptionalen, posttranskriptionalen, translationalen oder posttranslationalen Repressors erfolgt.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 14, wobei das Verfahren eine Kombination aus mindestens zwei der in den

Ansprüchen 6, 10, 11 und 14 definierten Verfahren ist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 15, wobei der transgene Organismus eine Nutzpflanze ist.
17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei die Nutzpflanze Weizen, Gerste, Mais, Zuckerrübe, Zuckerrohr, Kartoffel, eine Brassicaceae, eine Leguminose oder Tabak ist.
18. Wirtsorganismus nach Anspruch 1, der das für das gewünschte Protein codierende Gen derart enthält, daß dessen Expression erst in Anwesenheit eines chemischen Induktors erfolgt.

10

11

2282.
09/85953

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
31. Mai 2001 (31.05.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/38508 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C12N 15/82.
A01H 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03119

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. September 2000 (05.09.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
199 56 272.5 23. November 1999 (23.11.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **MPB COLOGNE GMBH, MOLECULAR
PLANT & PROTEIN BIOTECHNOLOGY** [DE/DE]:
Neurather Ring 1, D-51063 Köln (DE).

(72) Erfinder: und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **DÜRING, Klaus**
[DE/DE]: Vorgebirgsweg 33, D-50226 Frechen-Königs-
dorf (DE). **BÜLOW, Lorenz** [DE/DE]: Werder 2, D-38100
Braunschweig (DE).

(74) Anwalt: **HUBER, Bernard**; Patentanwälte Huber &
Schüssler, Truderinger Strasse 246, D-81825 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES,
FI, GB, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP,
KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 31. Januar 2002

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR CARRYING OUT THE CONTROLLED POST-HARVEST PRODUCTION OF PROTEINS IN HOST
ORGANISMS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR GESTEUERTEN NACH-ERNT-PRODUKTION VON PROTEINEN IN WIRTSORGA-
NISMEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for extracting a desired protein from a transgenic host organism, whereby the expression of the gene that codes for this protein is firstly carried out after the host organism has been harvested. The inventive method is characterized in that: (a) the transgenic host organism contains the gene that codes for the desired protein in such a way that the expression thereof is firstly carried out in the presence of a chemical inductor, and; (b) the gene is brought into contact with the inductor via the phase surrounding the host organism after the host organism has been harvested. The invention also relates to a host organism that is suited for carrying out said method.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Verfahren zur Gewinnung eines gewünschten Proteins aus einem transgenen Wirtsorganismus, wobei die Expression des für dieses Protein codierende Gens erst nach der Ernte des Wirtsorganismus erfolgt und das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, da: (a) der transgene Wirtsorganismus das für das gewünschte Protein codierende Gen derart enthält, da dessen Expression erst in Anwesenheit eines chemischen Induktors erfolgt und; (b) das Inkontaktbringen mit dem Induktor nach der Ernte des Wirtsorganismus über die den Wirtsorganismus umgebende Phase erfolgt. Ferner betrifft die Erfindung einen zur Durchführung diese Verfahrens geeigneten Wirtsorganismus.

WO 01/38508 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No

PCT/DE 00/03119

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C12N15/82 A01H5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C12N A01H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

BIOSIS, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 95 03690 A (VIRGINIA TECH INTELL PROP) 9 February 1995 (1995-02-09) pages 17,18,25,26; Table 3 ---	1-4,6, 16-18
X	WO 99 15668 A (THOMPSON BOYCE PLANT RES) 1 April 1999 (1999-04-01) page 5,19, see page 19, line 28 to page 20, lines 1-2, claims 21,25-30 ---	1,3,4,6, 16-18
A	WO 97 22707 A (CERFF RUEDIGER ;DUERING KLAUS (DE); HEHL REINHARD (DE); KOEHLER UW) 26 June 1997 (1997-06-26) cited in the application the whole document --- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 June 2001

Date of mailing of the international search report

19/06/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Holtorf, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: 31 Application No
PCT/DE 00/03119

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 99 23234 A (DUN CORNELIS MARIA PETRUS VAN ;MOGEN INT (NL); GODDIJN OSCAR JOHAN) 14 May 1999 (1999-05-14) the whole document ----	
A	WO 95 00555 A (EUROP MOLECULAR BIOLOGY LAB EM ;STEWART FRANCIS (DE)) 5 January 1995 (1995-01-05) cited in the application the whole document ----	
A	GATZ C: "CHEMICAL CONTROL OF GENE EXPRESSION" ANNUAL REVIEW OF PLANT PHYSIOLOGY AND PLANT MOLECULAR BIOLOGY,ANNUAL REVIEWS INC,XX, vol. 48, 1997, pages 89-108, XP000979191 ISSN: 1040-2519 -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern: 31 Application No

PCT/DE 00/03119

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9503690 A	09-02-1995	AU 7518994 A	28-02-1995
		CA 2168430 A	09-02-1995
		EP 0712273 A	22-05-1996
		JP 9503652 T	15-04-1997
		SG 46678 A	20-02-1998
		US 5670349 A	23-09-1997
		US 5689056 A	18-11-1997
		ZA 9405745 A	14-03-1995
WO 9915668 A	01-04-1999	AU 9471298 A	12-04-1999
		EP 1017820 A	12-07-2000
WO 9722707 A	26-06-1997	DE 19547272 C	27-03-1997
		AU 724617 B	28-09-2000
		AU 2020897 A	14-07-1997
		CA 2246299 A	26-06-1997
		EP 0876496 A	11-11-1998
		JP 2000515361 T	21-11-2000
		US 6194201 B	27-02-2001
WO 9923234 A	14-05-1999	AU 1487799 A	24-05-1999
		BR 9813340 A	22-08-2000
		CN 1280626 T	17-01-2001
		EP 1027449 A	16-08-2000
		ZA 9809782 A	04-05-1999
WO 9500555 A	05-01-1995	EP 0632054 A	04-01-1995
		AT 152123 T	15-05-1997
		AU 7227994 A	17-01-1995
		CA 2166198 A	05-01-1995
		DE 69402863 D	28-05-1997
		DE 69402863 T	31-07-1997
		EP 0707599 A	24-04-1996
		ES 2101552 T	01-07-1997
		JP 2986915 B	06-12-1999
		JP 8511681 T	10-12-1996
		US 6040430 A	21-03-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern: ☐ des Aktenzeichens

PCT/DE 00/03119

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C12N15/82 A01H5/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C12N A01H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

BIOSIS, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 95 03690 A (VIRGINIA TECH INTELL PROP) 9. Februar 1995 (1995-02-09) pages 17,18,25,26; Table 3 ---	1-4,6, 16-18
X	WO 99 15668 A (THOMPSON BOYCE PLANT RES) 1. April 1999 (1999-04-01) page 5,19, see page 19, line 28 to page 20, lines 1-2, claims 21,25-30 ---	1,3,4,6, 16-18
A	WO 97 22707 A (CERFF RUEDIGER ;DUERING KLAUS (DE); HEHL REINHARD (DE); KOEHLER UW) 26. Juni 1997 (1997-06-26) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument --- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Juni 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

19/06/2001

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Holtorf, S

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. Aktenzeichen

PCT/DE 00/03119

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 99 23234 A (DUN CORNELIS MARIA PETRUS VAN ;MOGEN INT (NL); GODDIJN OSCAR JOHAN) 14. Mai 1999 (1999-05-14) das ganze Dokument ----	
A	WO 95 00555 A (EUROP MOLECULAR BIOLOGY LAB EM ;STEWART FRANCIS (DE)) 5. Januar 1995 (1995-01-05) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----	
A	GATZ C: "CHEMICAL CONTROL OF GENE EXPRESSION" ANNUAL REVIEW OF PLANT PHYSIOLOGY AND PLANT MOLECULAR BIOLOGY,ANNUAL REVIEWS INC,XX, Bd. 48, 1997, Seiten 89-108, XP000979191 ISSN: 1040-2519 -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat. les Aktenzeichen

PCT/DE 00/03119

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9503690 A	09-02-1995	AU 7518994 A	28-02-1995
		CA 2168430 A	09-02-1995
		EP 0712273 A	22-05-1996
		JP 9503652 T	15-04-1997
		SG 46678 A	20-02-1998
		US 5670349 A	23-09-1997
		US 5689056 A	18-11-1997
		ZA 9405745 A	14-03-1995
WO 9915668 A	01-04-1999	AU 9471298 A	12-04-1999
		EP 1017820 A	12-07-2000
WO 9722707 A	26-06-1997	DE 19547272 C	27-03-1997
		AU 724617 B	28-09-2000
		AU 2020897 A	14-07-1997
		CA 2246299 A	26-06-1997
		EP 0876496 A	11-11-1998
		JP 2000515361 T	21-11-2000
		US 6194201 B	27-02-2001
WO 9923234 A	14-05-1999	AU 1487799 A	24-05-1999
		BR 9813340 A	22-08-2000
		CN 1280626 T	17-01-2001
		EP 1027449 A	16-08-2000
		ZA 9809782 A	04-05-1999
WO 9500555 A	05-01-1995	EP 0632054 A	04-01-1995
		AT 152123 T	15-05-1997
		AU 7227994 A	17-01-1995
		CA 2166198 A	05-01-1995
		DE 69402863 D	28-05-1997
		DE 69402863 T	31-07-1997
		EP 0707599 A	24-04-1996
		ES 2101552 T	01-07-1997
		JP 2986915 B	06-12-1999
		JP 8511681 T	10-12-1996
		US 6040430 A	21-03-2000

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts M 4375 / st	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 2px;"> WEITERES VORGEHEN </td> <td style="padding: 2px;"> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5 </td> </tr> </table>		WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 00/ 03119	Internationales Anmeldedatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> 05/09/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> 23/11/1999		
Anmelder MPB COLOGNE GMBH MOLECULAR PLANT & PROTEIN BIOTECH				

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.
- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das
- ☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☒ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☒ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☒ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☒ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

- ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
- ☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

- ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
- ☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. —

- ☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen ☐ keine der Abb.
- ☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.
- ☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C12N15/82 A01H5/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C12N A01H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

BIOSIS, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 95 03690 A (VIRGINIA TECH INTELL PROP) 9. Februar 1995 (1995-02-09) pages 17,18,25,26; Table 3 ---	1-4,6, 16-18
X	WO 99 15668 A (THOMPSON BOYCE PLANT RES) 1. April 1999 (1999-04-01) page 5,19, see page 19, line 28 to page 20, lines 1-2, claims 21,25-30 ---	1,3,4,6, 16-18
A	WO 97 22707 A (CERFF RUEDIGER ;DUERING KLAUS (DE); HEHL REINHARD (DE); KOEHLER UW) 26. Juni 1997 (1997-06-26) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument --- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Juni 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

19/06/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Holtorf, S



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 99 23234 A (DUN CORNELIS MARIA PETRUS VAN ;MOGEN INT (NL); GODDIJN OSCAR JOHAN) 14. Mai 1999 (1999-05-14) das ganze Dokument ----	
A	WO 95 00555 A (EUROP MOLECULAR BIOLOGY LAB EM ;STEWART FRANCIS (DE)) 5. Januar 1995 (1995-01-05) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----	
A	GATZ C: "CHEMICAL CONTROL OF GENE EXPRESSION" ANNUAL REVIEW OF PLANT PHYSIOLOGY AND PLANT MOLECULAR BIOLOGY,ANNUAL REVIEWS INC,XX, Bd. 48, 1997, Seiten 89-108, XP000979191 ISSN: 1040-2519 -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In on on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/03119

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9503690	A	09-02-1995	AU 7518994 A CA 2168430 A EP 0712273 A JP 9503652 T SG 46678 A US 5670349 A US 5689056 A ZA 9405745 A	28-02-1995 09-02-1995 22-05-1996 15-04-1997 20-02-1998 23-09-1997 18-11-1997 14-03-1995
WO 9915668	A	01-04-1999	AU 9471298 A EP 1017820 A	12-04-1999 12-07-2000
WO 9722707	A	26-06-1997	DE 19547272 C AU 724617 B AU 2020897 A CA 2246299 A EP 0876496 A JP 2000515361 T US 6194201 B	27-03-1997 28-09-2000 14-07-1997 26-06-1997 11-11-1998 21-11-2000 27-02-2001
WO 9923234	A	14-05-1999	AU 1487799 A BR 9813340 A CN 1280626 T EP 1027449 A ZA 9809782 A	24-05-1999 22-08-2000 17-01-2001 16-08-2000 04-05-1999
WO 9500555	A	05-01-1995	EP 0632054 A AT 152123 T AU 7227994 A CA 2166198 A DE 69402863 D DE 69402863 T EP 0707599 A ES 2101552 T JP 2986915 B JP 8511681 T US 6040430 A	04-01-1995 15-05-1997 17-01-1995 05-01-1995 28-05-1997 31-07-1997 24-04-1996 01-07-1997 06-12-1999 10-12-1996 21-03-2000

